



РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТУ после лечения периодонтита

Уважаемый пациент! Наше сотрудничество необходимо для сохранения длительного положительного результата лечения. Выполнение указанных рекомендаций позволит Вам сократить число вынужденных визитов к стоматологу.

1. Пищу можно принимать после прекращения действия анестезии, но следует избегать чрезмерных жевательных нагрузок в течение суток.

2. Помните, что после лечения возможны осложнения в виде болезненного надкусывания (до 10 дней), появления отека. В этих случаях нужно обратиться к своему лечащему врачу.

3. Если воспалительный процесс в зубе затронул ткани периодонта, и Вы желаете сохранить зуб, необходимо быть терпеливым, ибо лечение может быть с различными сроками, в зависимости от степени сложности каналов и характера воспаления тканей вокруг корней.

4. Один раз в полгода необходимо посещать стоматолога для шлифования и полирования поверхности пломбы (восстановление блеска, устранение краевой пигментации, герметизация границ) и профилактического осмотра.

5. Регулярные (не реже одного раза в год) профосмотры позволяют выявить новые кариозные поражения, в том числе на участках, прилегающих к ранее наложенным пломбам. Лечение, проведенное на ранних стадиях развития кариеса, позволяет полностью остановить прогрессирование процесса разрушения твердых тканей зуба.

6. При разрушении коронковой части зуба более 50% желательно изготовление ортопедической конструкции с целью сохранения зуба и его функций.

7. Несмотря на высокий положительный результат эндодонтического лечения, успешный результат не может быть гарантирован на 100%. Может потребоваться повторное лечение корневых каналов, резекция или даже удаление зуба. Поэтому важно динамическое наблюдение за состоянием лечения, включающее в себя консультацию лечащего врача и повторное рентгенологическое обследование через 6, 12, 18 месяцев.

Улыбайтесь на здоровье!